

レジメン名： Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PEール： 42(日)

クール数： 1

対象疾患名： 切除不能な進行・再発非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)

薬品名・規格	投与量	投与方法	day( )	day(1)	day(2)	day(3)	day( )	day(22)	day(23)	day(24)	day( )	day(42)
アプレピタント	初日 125 mg 2,3日目 80 mg	内服		●	●	●		●	●	●		
初日は抗癌剤投与1~1.5時間前に、2・3日目は午前中に服用												
ホスアプレピタント	150 mg	点滴		●				●				
抗悪性腫瘍剤の投与1時間前に30分間かけて												
※ アプレピタント又はホスアプレピタントのどちらかを選択												
パンビタン	1 g	内服	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→●
ペトレキセド投与7日以上前および最終投与日から22日目まで連日投与												
メコバラミン	1 mg	筋注	●									
ペトレキセド投与の少なくとも7日前および最終投与日から22日目まで9週ごとに投与												
オプジーボ	360 mg/body	点滴		●				●				
ヤーボイ	1 mg/kg	点滴		●								
アロキシ	0.75 mg	点滴		●				●				
デキサート	9.9 mg											
ペトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴		●				●				
カルボプラチン	AUC5~6	点滴		●				●				
本レジメン終了後は、維持療法としてNivolumab+Ipilimumabに移行する。												