

レジメン名： IRIS+Bevacizumab

1クール： 28日

クール数： 10クール

対象疾患名： 進行・再発大腸癌

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day(2)	day(3)	day()	day(14)	day(15)	day(16)	day(17)	day()	day(28)
アプレピタント(オプション)	初日 125 mg 2,3日目 80 mg	内服		●	●	●			●	●	●		
初日は抗癌剤投与1~1.5時間前に、2・3日目は午前中に服用													
プロイメンド(オプション)	150 mg	点滴		●					●				
抗悪性腫瘍剤の投与1時間前に30分間かけて													
アプレピタント又はプロイメンドのどちらかをオプション選択													
デカドロン	8 mg	内服			●	●				●	●		
アプレピタント又はプロイメンドを使用しない場合に併用													
エスワンタイホウ	※ mg/m ²	内服		●	→	→	→	●					
※体表面積に応じて投与 1.25m ² 未満:80mg/日 1.25以上1.5m ² 未満:100mg/日 1.5m ² 以上:120mg/日													
グラニセトロン	3 mg	点滴		●					●				
デカドロン	6.6 mg												
アバスチン	5 mg/kg	点滴		●					●				
トポテシン	100 mg/m ²	点滴		●					●				