

レジメン名: IRIS

1クール: 28日

クール数: 10クール

対象疾患名: 進行・再発大腸癌

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day(2)	day(3)	day()	day(14)	day(15)	day(16)	day(17)	day()	day(28)
アプレピタント	初日 125 mg 2,3日目 80 mg	内服		●	●	●			●	●	●		
初日は抗癌剤投与1~1.5時間前に、2・3日目は午前中に服用													
ホスアプレピタント	150 mg	点滴		●					●				
抗悪性腫瘍剤の投与1時間前に30分間かけて													
アプレピタント又はホスアプレピタントのどちらかをオプション選択													
デカドロン	8 mg	内服			●	●				●	●		
アプレピタント又はホスアプレピタントを使用しない場合に併用													
エスワン	※ mg/m <sup>2</sup>	内服		●	—————	—————	—————	—————	—————	—————	—————	—————	—————
※体表面積に応じて投与 1.25m <sup>2</sup> 未満:80mg/日 1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満:100mg/日 1.5m <sup>2</sup> 以上:120mg/日													
グラニセトロン	3 mg	点滴		●					●				
デキサート	4.95 mg												
※アプレピタント又はホスアプレピタントを併用しない場合はデキサメタゾン9.9mg													
イリノテカン	125 mg/m <sup>2</sup>	点滴		●					●				