

レジメン名: Nivolumab+mFOLFOX6

1クール: 14日

クール数:

対象疾患名: 治癒切除不能な進行・再発の胃癌

薬品名	投与量	投与方法	day(1)	day(2)	day(3)	day()	day(14)
アプレピタント	初日 125 mg 2,3日目 80 mg	内服	●	●	●		
初日は抗悪性腫瘍剤投与1~1.5時間前に、2・3日目は午前中に服用							
ホスアプレピタント	150 mg	点滴	●				
抗悪性腫瘍剤の投与1時間前に30分間かけて							
※ アプレピタント又はホスアプレピタントのどちらかをオプション選択							
デカドロン	8 mg	内服		●	●		
※ アプレピタントカプセル又はホスアプレピタントを使用しない場合に併用							
オブジーボ	240 mg/body	点滴	●				
グラニセトロン	3 mg	点滴	●				
デキサート	4.95(※) mg						
(※)アプレピタント又はホスアプレピタントを使用しない場合は9.9mg							
レボホリナート	200 mg/m ²	点滴(側管)	●				
オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴	●				
フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴	●				
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	静脈リザーバより	●	●			