

レジメン名: Pembrolizumab+FP 1~6クール 1クール: 21日

クール数: 6

対象疾患名: 根治切除不能な進行・再発の食道癌

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day(21)
アプレピタント	初日 125 mg 2,3日目 80 mg	内服		●	●	●				
初日は抗癌剤投与1~1.5時間前に、2・3日目は午前中に服用										
ホスアプレピタント	150 mg	点滴		●						
抗悪性腫瘍剤の投与1時間前に30分間かけて										
※ アプレピタント又はホスアプレピタントのどちらかを選択										
デカドロン	8 mg	内服			●	●	●			
アロキシ	0.75 mg	点滴		●						
デキサート	9.9 mg									
キイトルーダ	200 mg/body	点滴		●						
ラシックス	10 mg	静注(側管)		●						
シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴		●						
ラシックス	10 mg	静注(側管)		●						
フルオロウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	点滴		●	→	→	→	●		

レジメン名: Pembrolizumab+FP 7クール以降クール: 21日

クール数: 29

対象疾患名: 根治切除不能な進行・再発の食道癌

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day(21)
デキサート	6.6 mg	点滴		●						
キイトルーダ	200 mg/body	点滴		●						
フルオロウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	点滴		●	→	→	→	●		