

レジメン名: TC

1クール: 21日

クール数: 4

対象疾患名: 乳癌

| 薬品名                             | 投与量                      | 投与方法 | day(1) | day(2) | day(3) | day() | day(21) |
|---------------------------------|--------------------------|------|--------|--------|--------|-------|---------|
| アプレピタント                         | 初日 125 mg<br>2,3日目 80 mg | 内服   | ●      | ●      | ●      |       |         |
| プロイメンド                          | 150 mg                   | 点滴   | ●      |        |        |       |         |
| ※ アプレピタント又はプロイメンドのどちらかをオプション選択  |                          |      |        |        |        |       |         |
| デカドロン                           | 8 mg                     | 内服   |        | ●      | ●      |       |         |
| ※ アプレピタント又はプロイメンドを使用しない場合に併用    |                          |      |        |        |        |       |         |
| グラニセトロン                         | 3 mg                     | 点滴   | ●      |        |        |       |         |
| デキサート                           | 4.95 mg                  |      |        |        |        |       |         |
| ドセタキセル                          | 75 mg/m <sup>2</sup>     | 点滴   | ●      |        |        |       |         |
| エンドキサン                          | 600 mg/m <sup>2</sup>    | 点滴   | ●      |        |        |       |         |
| ジーラスタ                           | 3.6 mg                   | 皮下   |        | ●      |        |       |         |
| 抗がん剤投与24時間以後に投与<br>フィルグラスチムで代用可 |                          |      |        |        |        |       |         |