

レジメン名: Bendamustine±Rituximab or Obinutuzumab 1クール: 21日 クール数: 制限なし

対象疾患名: 再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫、マールセル細胞リンパ腫

薬品名	投与量	投与方法		day(1)	day(2)	day(3)	day()	day()	day()	day(21)
アプレピタント	初日 125 mg 2,3日目 80 mg	内服		●	●	●				
グラニセトロン	3 mg	点滴		●	●					
デキサート	4.95 mg									
トレアキシシ	120 mg/m ²	点滴		●	●					

レジメン名： Bendamustine±Rituximab or Obinutuzumab

クール： 28日

クール数： 6

対象疾患名： 再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫、マール細胞リンパ腫

薬品名	投与量	投与方法		day(1)	day(2)	day(3)	day()	day()	day()	day(28)
リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴								
Rituximabのレジメンスケジュールに従い、クール毎に1回投与										
ガザイバ	1000 mg	点滴								
Obinutuzumabのレジメンスケジュールに従い、クール毎に1回(1クール目は3回)投与										
※ Rituximab又はObinutuzumabのどちらかを選択、開始日指定なし										
アプレピタントカプセル	初日 125 mg 2,3日目 80 mg	内服		●	●	●				
初日：抗癌剤投与1～1.5時間前 2,3日目：午前中服用										
グラニセトン	3 mg	点滴		●	●					
デキサート	4.95 mg									
トレアキシシ	90 mg/m ²	点滴		●	●					