

レジメン名：PD+Elotuzumab 1・2クール

1クール：28日

クール数：2

対象疾患名：再発・難治性の多発性骨髄腫

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day()	day(8)	day()	day(15)	day()	day(21)	day(22)	day()	day(28)
レナデックス	28※ mg	内服		●		●		●			●		
エムプリシティ点滴静注用投与3時間前までに ※>75歳の患者は8mgに減量する。													
ポマリスト	4 mg	内服		●	→	→	→	→	→	●			
レスタミンコーワ	50 mg	内服		●		●		●			●		
カロナール	500 mg												
エムプリシティ点滴静注用投与45分前までに													
デキサート	6.6 mg	静注(側管)		●		●		●			●		
ファモチジン	20 mg												
エムプリシティ点滴静注用投与45分前までに													
エムプリシティ	10 mg/kg	点滴※		●		●		●			●		
※速度規定あり													

レジメン名：PD+Elotuzumab 3クール以降 1クール：28日

クール数：制限なし

対象疾患名：再発・難治性の多発性骨髄腫

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day()	day(8)	day()	day(15)	day()	day(21)	day(22)	day()	day(28)
レナデックス	※ mg	内服		●		●		●			●		
※投与量：1日目は28mg(>75歳の場合は8mg)をエムプリシティ点滴静注用投与3時間前までに、8・15・22日目は40mg(>75歳の場合は20mg)投与を朝食後													
ポマリスト	4 mg	内服		●	→	→	→	→	→	●			
レスタミンコーワ	50 mg	内服		●									
カロナール	500 mg												
エムプリシティ点滴静注用投与45分前までに													
デキサート	6.6 mg	静注(側管)		●									
ファモチジン	20 mg												
エムプリシティ点滴静注用投与45分前までに													
エムプリシティ	20 mg/kg	点滴※		●									
※速度規定あり													