

レジメン名：PD+Isatuximab 1クール目

1クール：28日

クール数：1

対象疾患名：再発・難治性の多発性骨髄腫

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day()	day(8)	day()	day(15)	day()	day(21)	day(22)	day()	day(28)
ポマリスト	4 mg	内服		●	→	→	→	→	→	●			
レスタミンコーワ	50 mg	内服		●		●		●			●		
カロナール	1000 mg												
サークリサ投与1時間前に													
デキサート	33※ mg	静注(側管)		●		●		●			●		
ファモチジン	20 mg												
サークリサ投与1時間前に ※>75歳の患者は16.5mgに減量する。													
サークリサ	10 mg/kg	点滴※		●		●		●			●		
※速度規定あり													

レジメン名: PD+Isatuximab 2クール目以降 1クール: 28日

クール数: 制限なし

対象疾患名: 再発・難治性の多発性骨髄腫

薬品名・規格	投与量	投与方法		day(1)	day()	day(8)	day()	day(15)	day()	day(21)	day(22)	day()	day(28)
ポマリスト	4 mg	内服		●	→	→	→	→	→	●			
レスタミンコーワ	50 mg	内服		●				●					
カロナール	1000 mg												
サークリサ投与1時間前に													
レナデックス	40※ mg	内服				●					●		
※>75歳の患者は20mgに減量する。													
デキサート	33※ mg	静注(側管)		●				●					
ファモチジン	20 mg												
サークリサ投与1時間前に ※>75歳の患者は16.5mgに減量する。													
サークリサ	10 mg/kg	点滴		●				●					
※速度規定あり													