

レジメン名: CBDCA+PEM+Bevacizumab      クール: 21日

クール数: 6

対象疾患名: 非小細胞(非扁平上皮)肺癌

薬品名	投与量	投与方法	day()	day(1)	day(2)	day(3)	day()	day(21)
アプレピタント	初日 125 mg 2,3日目 80 mg	内服		●	●	●		
プロイメンド	150 mg	点滴		●				
※ アプレピタント又はプロイメンドのどちらかを選択								
パンビタン	1 g	内服	●	→	→	→	→	●
アリムタ投与7日以上前および最終投与日から22日目まで連日投与								
メコバラミン	1 mg	筋注	●					
アリムタ投与の少なくとも7日前および最終投与日から22日目まで9週ごとに投与								
アロキシ	0.75 mg	点滴		●				
デキサート	9.9 mg							
アリムタ	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴		●				
カルボプラチン	AUC 5	点滴		●				
アバスチン	15 mg/kg	点滴		●				

レジメン名: PEM+Bevacizumab maintenanceクール: 21日

クール数: 制限無し

対象疾患名: 非小細胞(非扁平上皮)肺癌

薬品名	投与量	投与方法		day()	day(1)	day()	day(21)
パンビタン	1 g	内服		●	→	→	●
アムリタ投与7日以上前および最終投与日から22日目まで連日投与							
メコバラミン	1 mg	筋注		●			
アムリタ投与の少なくとも7日前および最終投与日から22日目まで9週ごとに投与							
デキサート	6.6 mg	点滴			●		
アリムタ	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴			●		
アバスチン	15 mg/kg	点滴			●		